

к ГОСТ Р 52554—2006 Пшеница. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 1 Пункт 3.1. Таблица 1. Графа «Примерный перечень сортов». Для типов номеров I и V графа «Цвет». Для типа II, подтипов 1, 2 пункт 3.3	Требования безопасности изложены в 4.1 и 5.1. Альбидум 28 Допускается наличие побелевых, потускневших, обесцвеченных, мучнистых зерен в количестве, не нарушающем основного цвета	Требования, обеспечивающие безопасность пшеницы, изложены в 4.1, 4.4 и 5.4. — Допускается наличие обесцвеченных и мучнистых зерен в количестве, не нарушающем основного цвета
Раздел 3	Пшеницу 1-го и 2-го подтипов I и IV типов, соответствующую требованиям данного подтипа по стекловидности, но не отвечающую требованиям по его цвету, относят к тому подтипу, которому она отвечает по стекловидности, и добавляют слова «и нетиничная по цвету».	Пшеницу всех подтипов I—IV типов, соответствующую требованиям данного подтипа по стекловидности, но не отвечающую требованиям по его цвету, относят к тому подтипу, которому она отвечает по стекловидности.
	3.5 Пшеницу твердую, соответствующую требованиям данного подтипа по стекловидности, но не отвечающую требованиям по его цвету, относят к тому подтипу, которому она отвечает по стекловидности, и добавляют слова «и нетиничная по цвету».	—

Продолжение

В каком месте	Нанесено		Должно быть		
Пункт 4.1. Таблица 2. Показатель «Типовой состав». Для 1-го и 2-го классов	I—3 подтипы;			1—2 подтипы;	
для 3-го класса	I, III, IV типы, все подтипы и V тип.			I, III, IV типы, 1—3 подтипы и V тип.	
показатель «Цвет»	Должно быть				
	1-го	2-го	3-го	4-го	5-го
Таблица 3. Показатель «Цвет»	Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа				
	Допускается первая степень обесцвеченности	Допускается первая и вторая степени обесцвеченности	Допускается любая степень обесцвеченности и потемневшая		
таблица 3. Нанесение показателя «Массовая доля белка»	Должно быть				
Пункт 4.2	1-го	2-го	3-го	4-го	5-го
	Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа				
	Допускается первая степень обесцвеченности	Допускается первая и вторая степени обесцвеченности	Допускается любая степень обесцвеченности	Допускается потемневшая	
	Нанесено		Должно быть		
	%, не менее		% на сухое вещество, не менее		
	Класс пищевого определяют по наихудшему значению одного из показателей качества зерна, указанного в таблицах 2 и 3.			...	

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4. Пункты 4.5, 4.6	—	<p>4.5 Класс пшеницы определяют после ее послеуборочной обработки на технологических линиях очистки и сушки по всем показателям, установленным в таблицах 2 и 3 по наихудшему значению одного из показателей.</p> <p>4.6 Пшеница мягкая и твердая 1—4-го классов используется на продовольственные цели, а 5-го класса — на фуражные и технические цели.</p>
Пункт 6.18	по МУ 4082 [2] по МУ 5177 [3]	по [2] по [3]
Пункт 6.19	по МУК 2.6.1.1194 [4]	по [4]
Раздел 7	Пшеницу хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями зернохранилищах в соответствии с санитарными правилами и требованиями к условиям хранения, утвержденными в установленном порядке, и транспортируют в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.	<p>7.1 Пшеницу размещают, транспортируют и хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями транспортных средствах и зернохранилищах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.</p> <p>7.2 При размещении, транспортировании и хранении учитывают состояние зерна пшеницы, указанные в таблице 4.</p>

Окончание

В каком месте Таблица 4	Должно быть		
	Состояние пшеницы	Норма для пшеницы, %	
		яровой	зимней
По влажности			
Сухое	Не более 14,0	Не более 14,0	
Средней сухости	14,1—15,5	14,1—15,5	
Влажное	15,6—17,0	15,6—17,0	
Сырое	17,1 и более	17,1 и более	
По сорной примеси			
Чистое	Не более 1,0	Не более 1,0	
Средней чистоты	1,1—3,0	1,1—3,0	
Сорное	3,1 и более	3,1 и более	
По зерновой примеси			
Чистое	Не более 1,0	Не более 2,0	
Средней чистоты	1,1—5,0	2,1—7,0	
Сорное	5,1 и более	7,1 и более	

(ИУС № 8 2007 г.)